

# АМІАЧНА СЕЛІТРА

МІНЕРАЛЬНЕ, ГРАНУЛЬоване, Аміачно-нітратне добриво

Високоефективне добриво для саду та городу.

Азот загальний ( $\text{NH}_4\text{:NO}_3$ ) – не менше 34%.

Розмір гранул: 1-4 мм.

Містить азот у двох формах – швидкодіючій нітратній формі та в амонійній формі повільної дії. Тому добриво можна застосовувати як при посіві (має ефективність у холодному ґрунті), так і для підживлення. Наявність азоту в амонійній формі повільної дії гарантує тривалу доступність азоту для рослин, що особливо важливо для культур з довгим вегетаційним періодом (наприклад, цвітної капусти, ріпі, гороху, цибулі).

**Універсальне азотне добриво**, яке використовується при пересадці рослин, підживленні та як складова частина комплексних добрив. У чистому вигляді використовується на лужних ґрунтах, для кислотних ґрунтів застосовується у поєднанні з вапнуванням. Являє собою білі, легкорозчинні у воді гранули.

## Особливості:

- забезпечує рослини азотом,
- сприяє активному продукуванню білків та органічної речовини в рослинах,
- зростання вегетативних органів,
- підвищення врожаю сільськогосподарських культур,
- підвищує якісні показники,
- продовжує термін зберігання, транспортабельність та лежкість продукції.

**Способ застосування:** Використовується для основного внесення при перекопуванні ґрунту восени або передпосівного – навесні, під культивацію, а також для підживлення сільськогосподарських культур.

- при обробці ґрунту – 25-30 г/ $\text{m}^2$ ;
- при посадці рослин – 3-4 г в лунку;
- при підживленні – 3-4 г/ $\text{m}^2$ .

Для внесення в ґрунт рекомендується насипати на поверхню ґрунту необхідну кількість добрива і здійснити рясний полив. Також можна розводити добрива у воді. При дотриманні цих самих норм береться 10 л води.

## Рекомендації щодо застосування:

Культура	Норми основного внесення	Норми підживлення
газон	2 кг/сотку	1-1,5 кг/сотку
плодові та декоративні дерева	15-20 г/ $\text{m}^2$	20-30 г на 10 л води
плодові та декоративні кущі	10-15 г/ $\text{m}^2$	10 г/ $\text{m}^2$
картопля, цукровий та кормовий буряк	2-3 кг/сотку	1-1,5 кг/сотку
морква, цибуля, капуста, томати, перець, огірки	5-10 г/ $\text{m}^2$	5 г/ $\text{m}^2$
озімі, ярі зернові, ріпак	1,5-2 кг/сотку	1 кг/сотку

\*Важливо пам'ятати, що внесення надмірної кількості добрив на рослини діє гірше, ніж брак поживних речовин, не рекомендується для вирощування баштанних рослин.

**Увага:** Аміачна селітра є окислювачем та вибухою та пожежою небезпечною речовиною.

**Запобіжні заходи:** при попаданні на шкіру, очі, необхідно змити препарат водою.

**Перша допомога:** уникати контакту зі слізовою оболонкою, при ковтанні звернутися до лікаря.

**Умови зберігання:** зберігати окрім від харчових продуктів у сухому місці, недоступному для дітей та тварин. Поруч неприпустимо зберігати легкозаймисті предмети і рідини. Якщо у вас залишається зайве добриво, пересипте його в герметичну тару, наприклад, скляну банку з щільною кришкою. Обов'язково підпишіть і збережіть інструкцію.


**Утилізація:** порожню тару утилізувати як побутове сміття.

**Термін придатності** 3 роки(в непошкодженій упаковці з дотриманням умов зберігання)

**Дата фасування** 1.10.2022

**Країна походження:** Україна.

**Розфасовано згідно ТУ У 20.1-35429229-002:2022**



МАСА НЕТТО  
**5 КГ**  
(± 15 г)



30 kg max



ТОВ «УАПГ»

(Українська Агропромислова Група),  
Україна, 18028, м. Черкаси, пр. Хіміків, 74  
тел.: +38 044 286 19 25, www.uapg.ua

